

CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO SANO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE

LA COMUNIDAD VALENCIANA



VACUNA	MAYORES DE 60 AÑOS	NACIDOS ANTES DEL 66 MENORES DE 60 AÑOS	NACIDOS ENTRE 1966 Y 1984	NACIDOS CON POSTERIORIDAD A 1985
TÉTANOS, DIFTERIA, TOSFERINA	Punto de primovacuna (0-1-6), salvo que acredite vacunación. Recuerdo cada 10 años		Considerar primovacuna (verificar si es posible). Recuerdo cada 10 años	
SARAMPIÓN, PAPERAS, RUBÉOLA	Considerar inmune (si dudas verificar serológicamente)		Vacunar con 1 o 2 dosis	Considerar vacunado (si dudas verificar serológicamente)
VARICELA	Considerar inmune (si dudas verificar serológicamente)			Vacunar (2 dosis) todo adulto sin antecedente clínico y serología (-)
HEPATITIS B	Vacunar si existe posibilidad (verificación serológica)			Considerar vacunado (si dudas verificar serológicamente)
POLIO	Considerar inmune (si dudas verificar serológicamente). Plantear vacunación si riesgo epidemiológico		Considerar vacunado (si dudas verificar serológicamente y vacunar ante resultado negativo)	
ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA VNC13	Vacunar (1 dosis)		Indicada si existe otro factor de riesgo	
ANTINEUMOCÓCICA POLISACÁRIDA VNP23	Vacunar (posterior a VNC13)		Indicada si existe otro factor de riesgo	
GRIPE	Vacunar (1 dosis anual)		Indicada si existe otro factor de riesgo	
MENINGOCOCO C	En situación de epidemia u contacto social íntimo con caso confirmado de enf. Por Meningococo C			1 dosis

* En adulto sano se debe consultar siempre el RNV y actuar en consecuencia. Hay grupos de edad que han quedado fuera del RNV ya que han sido incluidos en calendarios vacunales anteriores y no están registrados